

**ИНСТРУКЦИЯ  
по применению лекарственного  
препарата для медицинского применения**

# Виброцил®

(Vibrocil®)

**Регистрационный номер:** П N015192/03

**Торговое название:** Виброцил®

**МНН или группировочное название:**

Диметинден+Фенилэфрин

**Лекарственная форма:** Капли назальные

**Состав (на 1 мл):**

*Активные вещества:* фенилэфрин

2,5 мг, диметиндена малеат 0,25 мг.

*Вспомогательные вещества:* бензалкония

хлорид 50 % раствор (в пересчете на

бензалкония хлорид) 0,2 мг (0,1 мг),

лимонной кислоты моногидрат 2,6 мг, натрия

гидрофосфат 4,4 мг, сорбитол 35 мг, лаванды

масло 0,2 мг, вода до 1 мл.

**Описание**

Прозрачный раствор от бесцветного до

слабо-желтого цвета со слабым запахом

лаванды.

**Фармакотерапевтическая группа:**

противоаллергическое средство

комбинированное (H1- гистаминовых

рецепторов блокатор+альфа-

адреномиметик).

**Код АТХ:** R01AB01.

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Виброцил® – комбинированный препарат, содержащий фенилэфрин и диметинден.

Фенилэфрин – симпатомиметическое

средство, при местном применении

оказывает умеренное сосудосуживающее

действие (за счет стимуляции

альфа1-адренорецепторов, расположенных

в венозных сосудах слизистой оболочки

носа), устраняет отёк слизистой оболочки

носа и его придаточных пазух.

Диметинден является противоаллергическим

средством – антагонистом гистаминовых

H1-рецепторов; не снижает активность

мерцательного эпителия слизистой носа.

**Фармакокинетика**

Виброцил® предназначен для местного

применения, и его активность не зависит от

концентрации активных веществ в плазме

крови.

**Показания к применению**

Острый ринит (в т.ч., насморк при простудных

заболеваниях); аллергический ринит (в т.ч.

при сенной лихорадке); вазомоторный ринит;

хронический ринит; острый и хронический

синусит; острый средний отит (в качестве вспомогательного метода лечения). Подготовка к хирургическим вмешательствам в области носа и устранение отёка слизистой оболочки носа и придаточных пазух после хирургических вмешательств в этой области.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к

фенилэфрину, диметиндена малеату или

другим компонентам препарата.

Атрофический ринит (в том числе, со

зловонным отделяемым – озена). Прием

ингибиторов МАО (одновременно или в

предшествующие 14 дней). Закротоугольная

глаукома. Детский возраст до 1 года.

**С осторожностью**

Сердечно-сосудистые заболевания

(артериальная гипертензия, аритмии,

генерализованный атеросклероз),

гипертиреоз, аденома предстательной железы,

сахарный диабет, обструкция шейки мочевого

пузыря (например, вследствие гипертрофии

предстательной железы), эпилепсия.

Как и в случае применения любых местных

сосудосуживающих средств, следует соблюдать

осторожность при назначении препарата

Виброцил® пациентам с выраженными

реакциями на симпатомиметики,

проявляющимися в виде бессонницы,

головокружения, тремора, сердечной аритмии

или повышения артериального давления.

**Применение в период беременности и**

**лактации**

Учитывая возможное системное

сосудосуживающее действие фенилэфрина,

Виброцил® не рекомендуется применять во

время беременности и кормления грудью.

**Способ применения и дозы**

Детям в возрасте младше 1 года:

противопоказано.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет (под

наблюдением взрослых): по 1–2 капли в

каждый носовой ход 3–4 раза в день.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет (под

наблюдением взрослых): по 3–4 капли в

каждый носовой ход 3–4 раза в день.

Подросткам в возрасте старше 12 лет и

взрослым: по 3–4 капли в каждый носовой

ход 3–4 раза в день.

Перед применением рекомендуется

тщательно очистить носовые ходы;

закапывают в нос, запрокинув голову. Это

положение головы сохраняют в течение

нескольких минут.

Препарат не следует применять непрерывно

более 7 дней. Если симптомы не проходят,

следует проконсультироваться с врачом.

**Побочное действие**

Классификация частоты возникновения

побочных эффектов (ВОЗ):

очень часто >1/10; часто от >1/100 до <1/10;

нечасто от >1/1000 до <1/100; редко от

>1/10000 до <1/1000; очень редко от <1/10000, включая отдельные сообщения.

*Со стороны дыхательной системы:*

Редко: дискомфорт в области носа, сухость в носу, носовое кровотечение.

*Местные реакции:*

Редко: жжение в области нанесения.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Передозировка препаратом Виброцил® может вызывать симпатомиметические эффекты, например, учащенное сердцебиение, преждевременное сокращение желудочков сердца, головную боль в области затылка, тремор, чувство усталости, повышение артериального давления, эмоциональное возбуждение, бессонницу, бледность кожных покровов. Препарат также может вызывать легкий седативный эффект, головокружение, чувство боли в желудке, тошноту, рвоту. Лечение: применение активированного угля, слабительных у детей младшего возраста; у взрослых и детей старше 6 лет – прием большого количества жидкости.

Специфического антидота нет.

Повышенное артериальное давление, вызванное фенилэфрином, можно устранить при помощи применения альфа-адреноблокаторов.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Фенилэфрин (как и другие сосудосуживающие средства) противопоказан больным, получающим ингибиторы МАО в данное время или получавшим их в течение 2 предыдущих недель. Не следует назначать препарат одновременно с три- и тетрациклическими антидепрессантами, бета-адреноблокаторами.

### **Особые указания**

Виброцил® не следует применять непрерывно на протяжении более 7 дней без консультации с врачом. Длительное или чрезмерное применение препарата может вызвать тахифилаксию и эффект “рикошета”, связанный с повторным развитием заложенности носа (медикаментозный ринит), привести к развитию системного сосудосуживающего действия.

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата Виброцил®! В противном случае возможно развитие проявлений системного действия препарата, особенно у детей и пациентов пожилого возраста.

У детей в возрасте младше 6 лет применяют только капли в нос.

Виброцил® не оказывает седативного действия (не влияет на скорость психомоторных реакций).

### **Влияние на способность вождения автотранспорта и управления механизмами**

Не влияет.

### **Форма выпуска**

Капли назальные по 15 мл во флакон темного стекла с навинчивающейся крышечкой-пипеткой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Производитель**

Новартис Консьюмер Хелс СА, Швейцария  
Рю де Летраз, п/я 269, 1260 Нион,  
Швейцария.

*Novartis Consumer Health SA, Switzerland  
Route de l'Etraz, Case postale 269, 1260 Nyon,  
Switzerland.*

**Юридическое лицо, на имя которого  
выдано регистрационное удостоверение  
и организация, принимающая претензии  
на территории Российской Федерации:**  
АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер". 123317, г.  
Москва, Пресненская набережная, д. 10.  
Тел. 8 (495) 777-98-50; факс 8 (495) 777-98-51  
Телефон бесплатной "Горячей линии"

☎ 8 800 2000 775

E-mail: rus.info@gsk.com



RU 936154 – 151096

